



Les chats ont toujours représenté un véritable défi...

...et leurs propriétaires ont besoin de solutions. En voici une qui peut changer les choses !



Lors de signes non spécifiques chez le chat tels que apathie, perte de poids et perte d'appétit, le SNAP® fPL™ vous permet d'éliminer l'hypothèse d'une pancréatite en seulement 10 minutes !




SNAP® fPL™ – pour un tableau diagnostique rapide et plus complet

Comme c'est le cas des autres tests IDEXX d'évaluation de la fonction pancréatique, le test SNAP® fPL™ chez le chat doit faire partie intégrante de vos bilans diagnostiques de base.

- **Importance clinique :** la pancréatite est une affection fréquente. Dans plus de 25 % des cas, les résultats du test Spec fPL® sont compatibles avec le diagnostic de pancréatite.¹
- **Précision :** le test fPL est le test de dosage sérologique le plus précis actuellement disponible.²
- **Rapidité :** le test SNAP® fPL™, en association avec les autres analyses réalisées sur les instruments de l'univers VetLab®, offre des résultats diagnostiques pendant la consultation de façon à ce que vous puissiez apporter des réponses rapides aux propriétaires inquiets et initier un traitement sans attendre.

La méthode d'évaluation de la fonction pancréatique la plus complète, disponible auprès d'IDEXX

Lipase pancréatique du chien	Lipase pancréatique du chat
Test quantitatif Spec cPL® disponible au Laboratoire IDEXX Alfort	Test quantitatif Spec fPL® disponible au Laboratoire IDEXX Alfort
Test qualitatif SNAP® cPL™ réalisable à la clinique	NOUVEAU : test qualitatif SNAP® fPL™ réalisable à la clinique



References:

1. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA
2. Forman MA, Shiroma JT, Armstrong PJ, Simpson KW, Robertson JE, Buch J. Evaluation of feline pancreas-specific lipase (Spec fPL®) for the diagnosis of feline pancreatitis [ACVIM Abstract 165]. J Vet Intern Med. 2009;23:733-734.