

BRAVECTO®

PROTECTION DE LONGUE DURÉE, CLIENT SATISFAIT¹

12

JUSQU'À 12 SEMAINES DE PROTECTION
CONTRE LES PUCES ET TIQUES



- ✓ Protège jusqu'à 12 semaines contre les puces et les tiques
- ✓ Aussi enregistré pour la gale sarcoptique et la démodécie
- ✓ Comprimé à croquer
- ✓ Sûr pour les chiots dès l'âge de 8 semaines et un poids de 2 kg
- ✓ Peut être donné aux chiennes reproductrices, gestantes et allaitantes
- ✓ Utilisable pour les colleys et autres races MDR1
- ✓ Exclusivement sur prescription vétérinaire

Bravecto fluralaner 112,5 mg comprimés à croquer pour chiens de très petite taille (2 - 4,5 kg), Bravecto fluralaner 250 mg comprimés à croquer pour chiens de petite taille (> 4,5 - 10 kg), Bravecto fluralaner 500 mg comprimés à croquer pour chiens de taille moyenne (> 10 - 20 kg), Bravecto fluralaner 1 000 mg comprimés à croquer pour chiens de grande taille (> 20 - 40 kg), Bravecto fluralaner 1 400 mg comprimés à croquer pour chiens de très grande taille (> 40 - 56 kg). Indications : Traitement des infestations par les tiques et les puces chez les chiens. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui assure : une activité insecticide immédiate et persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) pendant 12 semaines, une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 12 semaines pour *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* et *Dermacentor variabilis*, une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 8 semaines pour *Rhipicephalus sanguineus*. Afin d'être exposés à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir. L'effet sur les puces débute dans les 8 heures (*C. felis*) et dans les 12 heures pour les tiques (*I. ricinus*). Le produit peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Pour le traitement de la démodécie causée par *Demodex canis*. Pour le traitement des infestations par la gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*). Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Effets indésirables : Des effets gastro-intestinaux légers et transitoires tels que diarrhée, vomissements, nappérence et tylosisme ont été fréquemment observés lors des essais cliniques (1,6 % des chiens traités). Des convulsions et un état léthargique ont été très rarement rapportés dans les déclarations spontanées. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités), fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités), peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités), rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés). Posologie et voie d'administration : Voie orale. Bravecto doit être administré en fonction du tableau suivant (correspondant à une dose de 25-56 mg de fluralaner/kg de poids corporel dans une gamme de poids) : Poids du chien (kg)/Concentration et nombre de comprimés à administrer : 2 - 4,5 kg : 1x Bravecto 112,5 mg, >4,5 - 10 kg : 1x250 mg Bravecto, >10 - 20 kg : 1x500 mg Bravecto, >20 - 40 kg : 1x1.000 mg Bravecto, >40 - 56 kg : 1x1.400 mg. Les comprimés à croquer ne doivent pas être cassés ou divisés. Pour les chiens de plus de 56 kg de poids corporel, utiliser l'association de deux comprimés qui se rapproche le plus du poids corporel. Méthode d'administration : Administrer Bravecto comprimés à croquer au moment ou autour du moment du repas. Bravecto est un comprimé à croquer et est bien accepté par la plupart des chiens. Si le comprimé n'est pas pris volontairement par le chien, il peut également être donné avec de la nourriture ou directement dans la gueule. Le chien doit être surveillé pendant l'administration afin de s'assurer que le comprimé a bien été ingéré. Programme de traitement : Pour un contrôle optimal de l'infestation par les puces, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles de 12 semaines. Pour un contrôle optimal de l'infestation par les tiques, le calendrier de retraitement dépend de l'espèce des tiques. Voir rubrique 4.2. de la notice scientifique. Pour le traitement des infestations par *Demodex canis*, une seule dose du produit doit être administrée. Comme la démodécie est une maladie multifactorielle, il est recommandé de traiter également toute maladie sous-jacente de manière appropriée. Pour le traitement des infestations par la gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*), une seule dose du produit doit être administrée. La nécessité et la fréquence du retraitement doivent être conformes à l'avis du vétérinaire prescripteur. EU/2/13/158/001-01

1. J Vet Sci Technol 2017 8:3

my.msd-animal-health.be

 **MSD**
Animal Health
The Science of Healthier Animals®

BE-BRV-201000004